



www.haaretz.co.il

עודכן ב- 12/04/2010 11:01

תוחלת החיים הממוצעת בעולם עלתה בעשרים ואחת שנים בחצי המאה האחרונה

דו"ח חדש של האו"ם קובע כי חלה ירידה בשיעורי התמותה בגילים הצעירים ובמקביל, עלייה בקרב המבוגרים הנוטים לחלות, בעיקר במחלות לא מידבקות כמו סרטן, סוכרת ומחלות לב

מאת אסף שטול-טראורינג

כתב "הארץ" לענייני מדע

תוחלת החיים הממוצעת בעולם עלתה ב-60 השנים האחרונות ב-21 שנים: מ-47 ב-1950-1955 ל-68 ב-2005-2010. כך עולה מדו"ח של האו"ם שהגיש מזכיר הארגון באן-קי-מון.

העלייה הדרמטית בתוחלת החיים נרשמה בכל רחבי העולם. באסיה נרשמה העלייה הגדולה ביותר: מ-41 שנים ל-72 בסין, ומ-38 שנים ל-68 בהודו. תוחלת החיים של בעלי הכנסה גבוהה במדינות העשירות בעולם עלתה בחצי המאה האחרונה, מ-67 שנים ל-80, בעוד בקרב המדינות העניות ביותר עלתה תוחלת החיים מ-38 שנים ל-60. לשם השוואה, בשנת 1800 חיו בני אדם 30 שנים בממוצע.

על פי דו"ח האו"ם, העלייה בתוחלת החיים בעולם נובעת משיפור בתנאי התזונה וההיגיינה, ומהתקדמות באיכות החיסונים, במניעת התפשטות מחלות מידבקות ועלייה באיכות הטיפול הרפואי הניתן בהן.

בעוד חלה ירידה בשיעורי התמותה בגילאים צעירים, זיהה הדו"ח מגמת עלייה בתמותה בגילאים מבוגרים, בעיקר ממחלות לא מידבקות כגון סרטן, סוכרת ומחלות לב. מחלות אלה, הדורשות טיפולים ממושכים, צפויות להיות נטל מרכזי על מערכות הבריאות בעולם.

הנתונים על העלייה במקרי המוות ממחלות לא מידבקות בעולם לא מתייחסים לשטחי אפריקה שמדרום לקו הסהרה, שבהם מתחוללת מגפת האידס - עם 2.7 מיליון נדבקים חדשים מדי שנה - ושיעור התמותה בהם ממחלות מידבקות וטפילים עדיין גבוה.

על פי הדו"ח, כ-80% ממקרי התמותה בארה"ב ובאירופה מתרחשים מעל גיל 60, בעוד רק אחוז ממקרי התמותה מתרחש עד גיל ארבע. באפריקה, לעומת זאת, עד גיל ארבע מתרחשים 38% ממקרי התמותה. תוחלת החיים הממוצעת באפריקה היא כיום 55 שנים.

הדו"ח קורא לממשלות לנקוט צעדים לצמצום גורמי הסיכון למחלות כרוניות, כמו משקל

יתר, חוסר פעילות פיזית, עישון או צריכת יתר של אלכוהול. בנוסף, הדו"ח קורא לממשלות ברחבי העולם לחזק את מערכות הבריאות ולהתייחס לבעיית המחסור בצוותים רפואיים, בעיקר במדינות המתפתחות.

הדו"ח יעמוד השבוע לדיון בכינוס הסוכנות לאוכלוסיות של האו"ם, שנפתח היום במטה הארגון בניו יורק.

כל הזכויות שמורות, "הארץ" ©